

Prüfungsfragen und Prüfungsaufgaben

Fragen 1 - 19:

1. Modellieren Sie ein örtlich eindimensionales, stationäres Wärmeleitproblem (Integralbilanzformulierung, differentielle Form, Randbedingungen, Interfacebedingungen) !
2. Modellieren Sie ein örtlich dreidimensionales, stationäres Wärmeleitproblem (Integralbilanzformulierung, differentielle Form, Randbedingungen, Interfacebedingungen) !
3. Modellieren Sie ein örtlich eindimensionales, instationäres Wärmeleitproblem (Integralbilanzformulierung, differentielle Form, Anfangs- und Randbedingungen, Interfacebedingungen) !
4. Modellieren Sie ein örtlich dreidimensionales, instationäres Wärmeleitproblem (Integralbilanzformulierung, differentielle Form, Anfangs- und Randbedingungen, Interfacebedingungen) !
5. Modellieren Sie ein örtlich dreidimensionales, instationäres Wärmeleit-Wärmetransport-Problem (Integralbilanzformulierung, differentielle Form, Anfangs- und Randbedingungen, Interfacebedingungen) !
6. Modellieren Sie den Zugstab im statischen und im dynamischen Fall !
7. Beschreiben Sie den Spannungszustand in einem belasteten Körper im Gleichgewicht (totale Spannung, Spannungstensor, Kugeltensor, Deviator, Transformationsformel, Normal- und Tangentialspannung, Hauptspannungen, Invarianten des Spannungstensors) !
8. Leiten Sie die beschreibenden Gleichungen des statischen und dynamischen Kräfte- und Momentengleichgewichts her !
9. Beschreiben Sie den Verzerrungszustand (Greenscher Verzerrungstensor, Cauchyscher Verzerrungstensor) ! Welche geometrische Interpretation kann man den Komponenten des Verzerrungstensors geben ?
10. Leiten Sie die LAMÉschen Gleichungen aus dem Kräfte- und Momentengleichgewicht (Kinetik), den geometrischen Verzerrungs-Verschiebungsbeziehungen (Kinematik) und dem HOOKEschen Gesetz ($\sigma_{ij} = \lambda \varepsilon_{kk} \delta_{ij} + 2\mu \varepsilon_{ij}$) für isotrope, homogene Materialien im statischen Fall her ! Welche Randbedingungen sind möglich und was bedeuten sie mechanisch ?
11. Leiten Sie die NAVIER-LAMÉschen Gleichungen aus dem dynamischen Kräfte- und Momentengleichgewicht (Kinetik), den geometrischen Verzerrungs-Verschiebungsbeziehungen (Kinematik) und dem HOOKEschen Gesetz ($\sigma_{ij} = \lambda \varepsilon_{kk} \delta_{ij} + 2\mu \varepsilon_{ij}$) für isotrope, homogene Materialien im dynamischen Fall her ! Welche Rand- und Anfangsbedingungen sind möglich und was bedeuten sie mechanisch ?

12. Was verstehen Sie unter einem ebenen Verzerrungszustand und unter einem ebenen Spannungszustand ? Leiten Sie die beschreibenden Gleichungen für isotrope, homogene Materialien im statischen Fall her !
13. Was verstehen Sie unter der Lagrangeschen und Eulerschen Beschreibungsweise ?
14. Geben Sie das Transport-Theorem an und beweisen Sie es im örtlich eindimensionalen ($d = 1$) Fall ! Welche Anwendungen des Transport-Theorems haben Sie in der Vorlesung kennengelernt ?
15. Leiten Sie die Kontinuitätsgleichung und Bewegungsgleichungen aus dem Massenerhaltungssatz und dem Impulserhaltungssatz her !
16. Leiten Sie die Navier-Stokes-Gleichungen zur Beschreibung von inkompressiblen Newtonschen Fluiden her ! Welche Rand- und Anfangsbedingungen können Sie vorschreiben ?
17. Was versteht man unter der Dimensionsanalyse und wie hängt diese mit der Ähnlichkeitstheorie zusammen ?
18. Elektromagnetische Felder werden durch die Maxwellschen Gleichungen

$$\operatorname{curl} H = J + \frac{\partial D}{\partial t} \quad (1)$$

$$\operatorname{div} B = 0 \quad (2)$$

$$\operatorname{curl} E = -\frac{\partial B}{\partial t} \quad (3)$$

$$\operatorname{div} D = \varrho \quad (4)$$

und die konstitutiven Beziehungen

$$B = \mu H + \mu_0 M \quad (5)$$

$$D = \varepsilon E + P \quad (6)$$

$$J = \sigma E + J_i \quad (7)$$

beschrieben. Geben Sie die integralen Formulierungen der Maxwellschen Gleichungen an ! Leiten Sie die Vektorpotentialformulierung und die E -Feld-basierte Formulierung her !

19. Welche speziellen elektromagnetischen Regime kennen Sie ? Leiten Sie die beschreibenden Gleichungen für diese speziellen elektromagnetischen Regime aus den vollen Maxwell-Gleichungen her !

Aufgaben 1 - 10:

1. Man zeige, dass

a)

$$\lim_{\Delta x_1, \Delta x_2, \Delta x_3 \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x_1 \Delta x_2 \Delta x_3} \int_{x_1 - \frac{\Delta x_1}{2}}^{x_1 + \frac{\Delta x_1}{2}} \int_{x_2 - \frac{\Delta x_2}{2}}^{x_2 + \frac{\Delta x_2}{2}} \int_{x_3 - \frac{\Delta x_3}{2}}^{x_3 + \frac{\Delta x_3}{2}} f(\xi_1, \xi_2, \xi_3) d\xi_3 d\xi_2 d\xi_1 = f(x_1, x_2, x_3)$$

gilt, falls $f \in C(\Omega)$, $x = (x_1, x_2, x_3) \in \Omega$,

b)

$$\lim_{\Delta x_1, \Delta x_2, \Delta x_3 \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x_1 \Delta x_2 \Delta x_3} \int_{x_1 - \frac{\Delta x_1}{2}}^{x_1 + \frac{\Delta x_1}{2}} \int_{x_3 - \frac{\Delta x_3}{2}}^{x_3 + \frac{\Delta x_3}{2}} \left[\sigma(\xi_1, x_2 + \frac{\Delta x_2}{2}, \xi_3) - \sigma(\xi_1, x_2 - \frac{\Delta x_2}{2}, \xi_3) \right] d\xi_3 d\xi_1 = \frac{\partial \sigma(x)}{\partial x_2}$$

gilt, falls $\sigma \in C^1(\Omega)$.

2. Berechnen Sie analytisch das Temperaturfeld $u(\cdot)$ gemäss der Wärmeleitgleichung (1.5)_{V0} aus der Vorlesung für die Daten:

$a = 0, b = 1, \eta \in (0, 1)$ fix, $q = 0, f = 0, g_a = 1, g_b = 0$ und

$$\lambda(x) := \begin{cases} \lambda_1 = \text{const} > 0 & \text{für } x < \eta \\ \lambda_2 = \text{const} > 0 & \text{für } x > \eta \end{cases}$$

mit $0 < \lambda_1 < \lambda_2$!

Führen Sie Parameterstudien mit dem Wärmeleitkoeffizienten durch:

- a) $\lambda_1 \rightarrow 0$
- b) $\lambda_2 \rightarrow \infty$
- c) $\lambda_1 = \lambda_2$
- d) $\eta = 0, \eta = 1$

3. Bestimmen Sie die von einem (fixierten) Parameter $y \in (0, 1)$ abhängige Lösung $u_y(\cdot)$ der Randwertaufgabe (Wärmeleitproblem mit Punktquelle)

$$\begin{aligned} -u''(x) &= \delta(x - y), \quad x \in (0, 1) & (f_y = 1), \\ u(0) &= u(1) = 0, \end{aligned}$$

und zeigen Sie, dass

$$u(x) = \int_0^1 G(x, y) f(y) dy, \quad x \in [0, 1]$$

mit $G(x, y) := u_y(x)$ die Randwertaufgabe

$$\begin{aligned} -u''(x) &= f(x), \quad x \in (0, 1), \\ u(0) &= u(1) = 0. \end{aligned}$$

4. Die Bestimmung der Temperaturverteilung $u(y)$ in einem homogenen ($c, \rho, \lambda = \text{const.}$), mantelisierten, wärmequellenfreien, dünnen Draht der Länge l , der mit der Geschwindigkeit v bewegt wird, am linken Rand auf 1°C und rechten Rand auf 0°C gehalten wird, führt nach Skalierung $x = y/l$ auf das Randwertproblem (siehe Vorlesung)

$$-u''(x) + pu'(x) = 0, \quad \forall x \in (0, 1), \quad u(0) = 1, \quad u(1) = 0. \quad (8)$$

Bestimmen Sie $p = p(c, \rho, \lambda, v, l) = ?$, lösen Sie dann das Randwertproblem (8) analytisch und diskutieren Sie das Verhalten der Lösung für $v \rightarrow \infty$!

5. Sei $u \in C^2(Q_T)$, $f \in C(Q_T)$, $E \in C^1(0, \ell)$ und $\varrho \in C(0, \ell)$ mit $Q_T = (0, \ell) \times (0, T)$. Man zeige, dass dann $x^*, x^{**}, x^{***} \in (x_1, x_2)$ und $t^*, t^{**}, t^{***} \in (t_1, t_2)$ existieren, sodass die integrale Form (2.8) aus der Vorlesung zur Gleichung

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x^*, t^*) \varrho(x^*) \Delta t \Delta x = \frac{\partial}{\partial x}(E(x^{**}) \frac{\partial u}{\partial x}(x^{**}, t^{**})) \Delta t \Delta x + f(x^{***}, t^{***}) \Delta t \Delta x \quad (9)$$

äquivalent ist.

6. Ein homogener Zugstab ($\rho, E = \text{const.} > 0$) werde zeitharmonisch erregt, d.h. $f(x, t) = f(x) \exp(i\omega t)$ und $g_l(t) = g_l \exp(i\omega t)$, wobei ω die Erregerfrequenz bezeichnet. Man suche die periodischen Lösungen und bestimme die kritischen Frequenzen (siehe auch Folie 10, Ü 2.2) !

7. Schneiden Sie virtuell einen Würfel

$$" \Delta x " := \left[x_1 - \frac{\Delta x_1}{2}, x_1 + \frac{\Delta x_1}{2} \right] \times \left[x_2 - \frac{\Delta x_2}{2}, x_2 + \frac{\Delta x_2}{2} \right] \times \left[x_3 - \frac{\Delta x_3}{2}, x_3 + \frac{\Delta x_3}{2} \right]$$

aus einem im Gleichgewicht befindlichen Körper heraus und schreiben Sie das Kräftegleichgewicht (z.B. in x_1 -Richtung) auf (siehe auch Folie 11, Ü 2.4) !

8. Man zeige, dass aus dem dynamischen Momentengleichgewicht (14)_{dyn} und aus dem dynamischen Kräftegleichgewicht (15)_{dyn} in differentieller Form die Symmetrie des Spannungstensors folgt, d.h. (16)_{dyn} (die Nummern beziehen sich auf die entsprechenden Formelnummern in der Vorlesung) !

9. Man zeige, dass die linearisierten Verzerrungen $\varepsilon(v) = (\varepsilon_{ij}(v))$, $i, j = 1, 2, 3$, einer Verschiebungsfunktion $v = (v_1, v_2, v_3)^T \in [C^2(\Omega)]^3$ genau dann verschwinden (also $\varepsilon(v) = 0$), wenn $v \in \mathcal{R}$ eine (linearisierte) Starrkörperverschiebung ist, wobei der Unterraum $\mathcal{R} := \{v(x) = a \times x + b : a, b \in \mathbb{R}^3\}$ durch die Vektoren

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -x_2 \\ x_1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -x_3 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ 0 \\ -x_1 \end{pmatrix}$$

aufgespannt wird. Zeigen Sie weiters, dass sämtliche Verschiebungen $v \in \mathcal{R}$ orientierungserhaltend sind.

Hinweis: Zeigen, und verwenden Sie $\frac{\partial^2 v_i}{\partial x_j \partial x_k}(x) = \frac{\partial \varepsilon(v)_{ij}}{\partial x_k}(x) + \frac{\partial \varepsilon(v)_{ki}}{\partial x_j}(x) - \frac{\partial \varepsilon(v)_{jk}}{\partial x_i}(x)$.

10. Beweisen Sie das Transport-Theorem (Satz 3.1) für den Fall $d = 1$, d.h. die Formel

$$\frac{d\mathcal{F}}{dt}(t) = \int_{\omega(t)} \left[\frac{\partial F}{\partial t}(x, t) + \frac{\partial(F \cdot v)}{\partial x}(x, t) \right] dx \quad !$$