

06 Betrachtet werde das Dirichlet-Randwertproblem

$$\begin{aligned} -u''(x) + c(x)u(x) &= f(x) && \text{für } x \in (0, 1), \\ u(0) &= g_0, \\ u(1) &= g_1. \end{aligned}$$

Man transformiere dieses Randwertproblem auf eines mit homogenen Randdaten und gebe davon die Variationsformulierung an.

07 Man betrachte die Funktion

$$u(x) = x^\alpha, \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

Für welche $\alpha \in \mathbb{R}$ ist $u \in L^2(0, 1)$ bzw. $u \in H^1(0, 1)$?

08 Betrachtet werde das Neumann-Randwertproblem

$$\begin{aligned} -u''(x) &= f(x) && \text{für } x \in (0, 1), \\ -u'(0) &= g_0, \\ u'(1) &= g_1. \end{aligned}$$

Für dieses Randwertproblem leite man eine Variationsformulierung her:

Gesucht ist $u \in V_g$, sodass

$$a(u, v) = \langle F, v \rangle \quad \text{für alle } v \in V_0 \tag{2.1}$$

erfüllt ist.

Weiters zeige man die folgenden Aussagen.

(a) Falls das Variationsproblem (2.1) eine Lösung besitzt, dann gilt

$$\langle F, c \rangle = 0 \quad \text{für alle } c \in \mathbb{R}. \tag{2.2}$$

(b) Falls $u \in V_g$ eine Lösung des Variationsproblems (2.1) ist, dann ist $\hat{u} := u + c$ mit $c \in \mathbb{R}$ auch eine Lösung.

(c) Für die Wahl $c = -\int_0^1 u(x)dx$, gilt

$$\hat{u} \in \hat{V} := \left\{ v \in H^1(0, 1) : \int_0^1 v(x)dx = 0 \right\}.$$

(d) Falls die Bedingung (2.2) erfüllt ist, dann ist die Lösung des Variationsproblems:

Gesucht ist $\hat{u} \in \hat{V}$, sodass

$$a(\hat{u}, \hat{v}) = \langle F, \hat{v} \rangle \quad \text{für alle } \hat{v} \in \hat{V}$$

erfüllt ist,

auch eine Lösung des Variationsproblems (2.1).

- 9 Man zeige die Poincaré-Ungleichung: Es existiert eine Konstante $c_P > 0$, sodass gilt

$$\|v\|_{L^2(0,1)} \leq c_P \left[|v|_{H^1(0,1)}^2 + \left(\int_0^1 v(x) dx \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \quad \text{für alle } v \in H^1(0,1).$$

Hinweis: Man integriere die Gleichung

$$v(y) = v(x) + \int_x^y v'(z) dz$$

bezüglich x über das Intervall $(0, 1)$.

- 10 Man zeige, dass das Variationsproblem (2.1) genau dann eine Lösung besitzt, wenn die Lösbarkeitsbedingung

$$\langle F, c \rangle = 0 \quad \text{für alle } c \in \mathbb{R}$$

erfüllt ist. Unter dieser Bedingung zeige man, dass eine Lösung des Variationsproblems (2.1) bis auf eine additive Konstante eindeutig bestimmt ist.

Hinweis: Man verwende die Poincaré-Ungleichung um die \hat{V} -Elliptizität von $a(\cdot, \cdot)$ zu zeigen.