A-Stabilität impliziter RKM

Die Begriffe **Stabilitätsfunktion**, **Stabilitätsbereich**, **A-Stabilität** können völlig analog für implizite RKM eingeführt werden. Es gilt wieder:

$$\begin{aligned} R(z) &= b^\top [I - zA]^{-1} e \\ S &= \{z \in \mathbb{C} : |R(z)| \leq 1\} \end{aligned}$$

Unterschied zum expliziten Fall: A ist nicht strikte Dreiecksmatrix!
Die Matrix $I - zA$ ist invertierbar für alle $z \in \mathbb{C} \setminus \{1/\mu : \mu \in \sigma(A)\}$.

Form der Stabilitätsfunktion für eine s -stufige implizite RKM:

$$R(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$$

wobei P, Q Polynome vom Grad $\leq s$ und $P(0) = Q(0) = 1$.
(kann gezeigt werden)

Die **Aussage von Satz 2.40** gilt auch für den impliziten Fall. Für eine dissipative Gleichung der Form (18) gilt also:

A-Stabilität $\implies$ Kontraktivität $\implies$ Stabilität mit Stabilitätskonstante 1

Beispiel 2.50

1. Impliziter Euler

Für Gleichung (22):

$$\begin{aligned} u_{j+1} &= u_j + \tau_j \lambda u_{j+1} \\ \implies u_{j+1} &= \frac{1}{1 - \tau_j \lambda} u_j = R(\tau_j \lambda) u_j \quad \implies R(z) = \frac{1}{1 - z} \end{aligned}$$

Stabilitätsbereich $S = \{z \in \mathbb{C} : \frac{1}{|1-z|} \leq 1\} = \{z \in \mathbb{C} : |z-1| \geq 1\}$

$\mathbb{C}^- \subset S \implies$ A-stabil !

2. Implizite Mittelpunktsregel

$$\begin{aligned}g_1 &= u_j + \frac{\tau_j}{2}\lambda g_1 \quad \implies \quad g_1 = \frac{1}{1 - \frac{\tau_j\lambda}{2}}u_j \\u_{j+1} &= u_j + \tau_j\lambda g_1 \\ \implies \quad u_{j+1} &= \left(1 + \frac{\tau_j\lambda}{1 - \frac{\tau_j\lambda}{2}}\right)u_j = \underbrace{\left(\frac{1 + \frac{\tau_j\lambda}{2}}{1 - \frac{\tau_j\lambda}{2}}\right)}_{=R(\tau_j\lambda)}u_j \\ \implies \quad R(z) &= \frac{1 + \frac{z}{2}}{1 - \frac{z}{2}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}S &= \{z \in \mathbb{C} : |1 + \frac{z}{2}| \leq |1 - \frac{z}{2}|\} \\ &= \{\alpha + i\beta : (1 + \frac{\alpha}{2})^2 + \beta^2 \leq (1 - \frac{\alpha}{2})^2 + \beta^2\} = \mathbb{C}^-\end{aligned}$$

$\implies$ A-stabil

3. θ -Methode

Es kann gezeigt werden dass

- $R(z) = \frac{1 + (1 - \theta)z}{1 - \theta z}$
- $|R(z)| \leq 1 \iff (1 - 2\theta)|z|^2 + 2\operatorname{Re}(z) \leq 0$

$\implies$ nur A-stabil ist falls $\theta \geq 1/2$!